

## کتونکس® - ۱

۱. نام محصول

کتونکس® - ۱

۲. شکل عرضه

پودر در قوطی ۴۰۰ گرمی

۳. گروه هدف و کاربرد درمانی

شیر خشکی با ترکیب آمینو اسیدی اصلاح شده و حاوی آهن، جهت تأمین نیازهای تغذیه ای کودکان زیر یک سال مبتلا به بیماری MSUD می باشد. این فرآورده فاقد اسید آمینه های والین، لوسین و ایزولوسین می باشد. همچنین این فرآورده فاقد گلوتن و لاکتوز است.

۴. موارد احتیاط

این فرآورده به عنوان تنها منبع تغذیه ای محسوب نمی شود. در کنار این محصول لازم است مایعات و پروتئین به میزان تجویز شده توسط پزشک یا متخصص تغذیه مصرف گردد. این فرآورده جهت مصرف در اطفال زیر یک سال می باشد. با توجه به اینکه پودر شیر خشک استریل نمی باشد، مصرف در کودکان نارس و با کودکانی که دچار مشکلات ایمنی می باشند، بستگی به صلاحدید و تشخیص پزشک دارد.

۵. انرژی

با توجه به شرایط بیمار و صلاحدید فرد تجویز کننده، این فرآورده با کالری های ۲۰، ۲۴ و ۲۷ کیلوکالری بر ۳۰ سی سی و بر اساس جدول زیر قابل تهیه می باشد. مقدار مورد نیاز پودر جهت تهیه ۱۵۰ سی سی از محلول پس از اضافه کردن آب می باشد.

مقدار کالری (Kcal/۳۰ CC)	۲۰	۲۴	۲۷
مقدار پودر بر حسب گرم در ۱۵۰ سی سی از محلول آماده شده	۲۱	۲۵	۲۸

۶. دستورالعمل استفاده از محصول

جهت آماده سازی: ۱- ابتدا دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده شسته شود. ۲- مقدار تجویز شده از آب و پس از آن مقدار تجویز شده از پودر ( و نیز سایر مواد در صورتی که مورد نیاز باشد) به بطری آماده سازی اضافه گردد. ۳- برای مدت ۱۵-۱۰ ثانیه، بطری تکان داده شود؛ در صورتی که از مخلوط کن استفاده می شود بیشتر از ۵ ثانیه مخلوط نشود. به محض اینکه مصرف یک وعده ی آماده شده شروع شد، آن وعده باید ظرف مدت یک ساعت مصرف و باقیمانده دور ریخته شود.

۷. شرایط نگهداری

در صورت آماده سازی مقداری بیشتر از یک وعده ی تغذیه کودک و تمایل به نگهداری وعده ی آماده شده، ظرف حاوی محلول آماده شده باید بلافاصله پس از آماده سازی در داخل یخچال قرار گیرد و طی مدت ۲۴ ساعت مصرف شود. باید توجه شود به محض اینکه مصرف یک وعده توسط کودک شروع شد، آن وعده باید ظرف مدت یک ساعت مصرف و باقیمانده دور ریخته شود .

قوطی باز نشده و یا باز شده باید در دمای اتاق نگهداری شده و از نگهداری در دماهای بالا اجتناب گردد. محتویات قوطی باز شده باید طی مدت ۱ ماه مصرف شود .