

پروپیمکس® - ۲

۱. نام محصول
پروپیمکس® - ۲
۲. شکل عرضه
پودر، ۴۰۰ گرم در قوطی
۳. گروه هدف و کاربرد درمانی
کودکان بالای یک سال و افراد بزرگسال مبتلا به پروپیونیک اسیدمیا و متیل مالونیک اسیدمیا می باشد. این فرآورده فاقد اسید آمینه های متیونین و والین و دارای مقادیر پایین اسید آمینه های ترئونین و ایزولوسین می باشد. همچنین این محصول فاقد گلوتن و لاکتوز است.
۴. موارد احتیاط
این فرآورده به عنوان تنها منبع تغذیه ای محسوب نمی شود. در کنار این محصول لازم است مایعات و پروتئین به میزان تجویز شده توسط پزشک یا متخصص تغذیه مصرف گردد.
در کودکان زیر یک سال مصرف نشود.
حرارت دادن و استفاده این محصول در طبخ مجاز نمی باشد.
۵. انرژی
با توجه به شرایط بیمار و صلاحیت فرد تجویز کننده، این فرآورده با کالری های ۲۴، ۲۷ و ۳۰ کیلوکالری بر ۳۰ سی سی و بر اساس جدول زیر قابل تهیه می باشد. مقدار مورد نیاز پودر جهت تهیه ۱۵۰ سی سی از محلول پس از اضافه کردن آب می باشد.

مقدار کالری (Kcal/۳۰ CC)	۲۴	۲۷	۳۰
مقدار پودر بر حسب گرم در ۱۵۰ سی سی از محلول آماده شده	۲۵	۲۸	۳۱

۶. دستورالعمل استفاده از محصول
جهت آماده سازی: ۱- ابتدا دست ها، تمامی سطوح و ظروف مورد استفاده شسته شود. ۲- مقدار تجویز شده از آب و پس از آن مقدار تجویز شده از پودر (و نیز سایر مواد در صورتی که مورد نیاز باشد) به بطری آماده سازی اضافه گردد. ۳- برای مدت ۱۵-۱۰ ثانیه، بطری تکان داده شود؛ در صورتی که از مخلوط کن استفاده می شود بیشتر از ۵ ثانیه مخلوط نشود. به محض اینکه مصرف یک وعده ی آماده شده شروع شد، آن وعده باید ظرف مدت یک ساعت مصرف و باقیمانده دور ریخته شود.

۷. شرایط نگهداری

در صورت آماده سازی مقداری بیشتر از یک وعده و تمایل به نگهداری وعده ی آماده شده، ظرف حاوی محلول آماده شده باید بلافاصله پس از آماده سازی در داخل یخچال قرار گیرد و طی مدت ۲۴ ساعت مصرف شود. باید توجه شود به محض اینکه مصرف یک وعده شروع شد، آن وعده باید ظرف مدت یک ساعت مصرف و باقیمانده دور ریخته شود.

قوطی باز نشده و یا باز شده باید در دمای اتاق نگهداری شده و از نگهداری در دماهای بالا اجتناب گردد. محتویات قوطی باز شده باید طی مدت ۱ ماه مصرف